

ОСЛОЖНЕНИЯ ИСКУСТВЕННОГО АБОРТА

Многие женщины знают об аборте лишь то, что это прерывание не запланированной, не желанной беременности. На самом деле аборт серьёзное медицинское вмешательство, после которого, как и при любой другой медицинской процедуры, есть риск развития осложнений. Аборты отрицательно влияют на течение и исход последующих беременностей, подрывают здоровье женщины. После каждого аборта всё меньше шансов забеременеть снова либо доносить свою беременность до конца. Особенно это касается молодых, не рожавших женщин. Именно аборт при первой беременности женщины в 25% случаях становится причиной бесплодия.

Аборт – искусственное прерывание беременности сроком до 22 недель. По инициативе женщины аборт проводится только до 12 недель, далее - исключительно по строгим медицинским показаниям.

Вакуумный аборт - извлечение плодного яйца вакуумным отсосом.

Медикаментозный - производится с помощью лекарственных препаратов которые провоцируют выкидыш.

Выскабливание (хирургический аборт) - операция, во время которой врач выскабливает матку острой акушерской кюреткой и удаляет плодное яйцо.

Возможные осложнения:

При медикаментозном аборте

- маточные кровотечения
- неполный аборт
- инфекционные осложнения (риск развития их составляет менее 1% случаев);
- прогрессирование беременности в ситуации, когда не произошло отторжение плодного яйца.

При вакуумном и хирургическом аборте

Ранние осложнения

Возникают во время процедуры и в первые сутки послеоперационного периода.

- Кровотечение во время процедуры (при нарушении свертывающей системы крови, при плохом сокращении стенок матки у много рожавшей или перенесшей большое количество абортов женщины).
- Перфорация матки (случайный прокол) при вакуумном аборте возникает редко. При проведении выскабливания с помощью острой кюретки риск перфорации стенки матки увеличивается.
- Аллергическая реакция на препараты для наркоза.
- Травмы шейки матки.

Поздние осложнения

Могут наблюдаться в течение недели, нескольких месяцев после операции.

- Гематометра-скопление крови в полости матки.

- Длительное кровотечение, боли в нижней части живота могут свидетельствовать о том, что процедура была выполнена не полностью и в полости матки остались зародышевые элементы, что может стать причиной серьезных воспалительных процессов.
- Плацентарный полип-образовавшийся из остатков ворсин тканей плодного яйца. Может быть причиной болезненных, обильных и нерегулярных менструаций.
- Воспалительные заболевания органов малого таза. Чаще встречаются у пациенток со сниженным иммунитетом, хроническими инфекциями нижних половых путей.
Эндометриит (воспаления слизистой матки). Из матки воспалительный процесс восходящим путем может распространиться на маточные трубы и в малый таз. При воспалении и появлении гноя в маточных трубах развивается сальпингит. При втягивании в процесс яичника возникает сальпингоофорит и формируются спайки между яичником, трубами и маткой.
При излитии гноя из маточных труб в полость малого таза развивается перитонит, воспаление и спаечный процесс распространяется на соседние органы (петли кишечника, мочевого пузыря).
- Постабортная депрессия

Отдаленные последствия могут наблюдаться через годы после операции.

- После аборта всегда есть риск возникновения гормонального сдвига, в связи с чем может нарушиться менструальный цикл и нормальное созревание фолликулов в яичниках
- Вышеописанные воспалительные процессы половых органов могут привести к развитию спаечного процесса и непроходимости маточных труб (в дальнейшем - трубный фактор бесплодия). Воспаление слизистой матки также является частой причиной нарушений менструального цикла.
- Перенесенные воспалительные процессы и наличие спаек в малом тазу могут быть причиной синдрома хронической тазовой боли у женщин, который очень трудно поддается коррекции.
- Травмированная при аборте шейка матки может недостаточно выполнять запирающую функцию при беременности. Из-за недостаточности шейки матки могут происходить потери беременности в различных сроках или создаваться показания для наложения хирургического шва на шейку для сохранения беременности.